

# ดาตา 5 ขั กัสนัษักัด

ขั1

อย่าแหยั  
สัษัขัให้โมโห



ขั2

อย่าเหยยบ  
หาง หัว ตัว ขา หรือ  
ทำให้สัษัขัตกใจ



ขั3

อย่าแยก  
สัษัขัที่กำลังกััดกัน  
ด้วยมือเปล้า



ขั4

อย่าหยบ  
งานข้าวหรือเคล็อนย้าอาหาร  
ขณะสัษัขักำลังกินอาหาร



ขั5

อย่ายุงั  
หรือเข้าไกลัสัษัขัที่ไม่รู้จััก  
หรือไม่มีเจ้าของ



# เม็อถูกสัษัขัหรือแมว กััด ขัวน ต็อทำดัังนั้



**สัษัขักััด** ต็อลัองลัองแผล สัไสขั กัักนมา  
นานมอ ฉััดลััดขัซันต็อจนคระบขัุด

1

ลั้างแผลให้สะอาด  
ด้วยน้ำและสบู่หลายๆ ครัั้ง  
ให้ถัถึงกัันแผล  
ลั้างสบู่ออกให้หมด  
เช็ัดแผลให้แห้ง  
สัไสยารัักษาแผลสด

2

จดัจำสัตว์ที่ทัักัดให้ด็อเพื่อ  
สัไสบหาเจ้าของ/กัักหมา  
ไว้ดูอาการ 10 วัน  
สออบถามประวัตั  
การฉััดลััดขัซันป็องกััน  
โรคพัซซัสนัษัขับ้า

3

ไปหาหมอหรือ  
เจ้าหน้าทัี่สาธารณสุข  
เพื่อรับการป็องกัันที่ถูกต็ออง

# โรคพัซซัสนัษัขับ้า


ป็องกัันและทลัักเลยัอง  
ลัดคความเสยัองจากการถูกสัษัขักััด



พัซซัตโรคพัซซัสนัษัขับ้า  
เลยัองน็องทมาอยัางถูกวอวีรึ  
Understand it to defeat it



จดัทำโดย  
กองสาธารณสุขและสัั้งแวดลั้อม  
องคัการบรึหารสัวนตัาบลวังจันทรึ  
โทรศััพทั 032-465110 ต็อ 16  
www.obtwangchan.go.th



"ป็องกัันคนไทยถูกสัษัขักััด ไม่ตั่ากว่า 1 ลั้านคน"




# โรคพิษสุนัขบ้า



โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ เกิดจากเชื้อไวรัสเรบีส์ เป็นได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น ชะนี กระรอก กระแต โดยเฉพาะพบมากที่สุดในสุนัข และรองลงมาคือแมว

## การติดต่อ



คนและสัตว์รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ เมื่อถูกสัตว์ที่เป็นโรคนี้อัดหรือข่วน โดยเชื้อจะอยู่ในน้ำลาย ถ้าเป็นสุนัขและแมว จะพบว่า มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ออกมากับน้ำลายตั้งต่อก่อนแสดงอาการ 1-7 วัน

## อาการที่พบในคน

ส่วนใหญ่ระยะฟักตัวของโรค ตั้งแต่ 3 สัปดาห์ - 6 เดือน แต่บางรายมีระยะฟักตัวสั้นมากไม่ถึงสัปดาห์ หรืออาจนานเกิน 1 ปี อาการเริ่มแรกคือ เบื่ออาหาร เจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย มีอาการคันรุนแรงบริเวณที่ถูกกัดแล้วลามไปส่วนอื่น กระสับกระส่าย กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง เพ้อเจ้อ กลืนลำบาก โดยเฉพาะของเหลว กลัวน้ำ ปวดท้องน้อยและ ขากล้ามเนื้อกระตุก แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก เกร็ง อัมพาตหมดสติ และตายในที่สุด

## อาการที่พบในสุนัข

ระยะฟักตัวของโรคหลังจากถูกกัดหรือข่วน จะอยู่ในช่วง 3 - 8 สัปดาห์ ไม่เกิน 6 เดือน และจะตายภายใน 10 วัน หลังจากแสดงอาการ ซึ่งมีทั้งแบบดุร้าย และแบบซึม โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ

### ระยะแรก

สุนัขจะมีอารมณ์และนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม

### ระยะตื่นเต้น


สุนัขเริ่มมีอาการทางประสาท กระวนกระวายตื่นเต้น หงุดหงิดไม่อยู่นิ่ง กัดแทะสิ่งของไม่เลือก ม่านตาขยายกว้าง

### ระยะอัมพาต

สุนัขมีอาการค้างท้อยटक ลิ้นมีสีแดงคล้ำห้อยออกนอกปาก น้ำลายไหล ขย่อนอาหารคล้ายมีอะไรอยู่ในลำคอ ขาอ่อนเปลี้ยทรงตัวไม่ได้ล้มลง อัมพาตทั้งตัวอย่างรวดเร็วและตายในที่สุด

**“โรคนี้ไม่มีทางรักษาให้หายได้” หากมีอาการแล้ว ตายทุกราย**

## คำแนะนำ สำหรับคนเลี้ยงสุนัข



**1**  
นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี (ปีแรกควรรี๊ด 2 ครั้ง)



**2**  
ไม่ปล่อยให้สุนัขไปเล่นพ่วนในที่สาธารณะ ทุกครั้งที่น่าสุนัขออกนอกบ้าน ต้องอยู่ในสายจูง



**3**  
ไม่นำสุนัขไปปล่อยให้ และต้องคุมกำเนิด ไม่ให้มีสุนัขมากเกินไป

**หยุดปล่อยหมา หยุดปัญหาหมาจรจัด**