

เนื่องจากพบการระบาดของโรคหิวาต์แอฟริกาในประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ซึ่งพื้นที่การระบาดใกล้กับชายแดนประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสโรคหิวาต์แอฟริกาในสุกรเข้าสู่ประเทศมากยิ่งขึ้น

À

อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งมีการระบาดของโรคดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้เลี้ยงสุกรและประชาชนทราบดังนี้

À

-โรคหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นโรคไม่ติดต่อจากสัตว์สู่คน แต่เป็นอันตรายต่อสุกรเนื่องจากเป็นโรคแล้วตายไม่มีทางรักษา

À

-สุกรติดโรคได้จากการสัมผัสหรือไม่รับเชื้อโดยตรงจากสุกรป่วย ติดต่อกันโดยอ้อม เมื่อสุกรได้รับเชื้อจะมีระยะฟักตัวนาน ๕ - ๑๕ วัน สุกรจะมีไข้สูง นอนสุมร่วมกับท้องเสียเป็นเลือด ผิวน้ำแดง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำโดยเฉพาะใบหู ท้อง มีอาการ ไอ แท้ง และขาหลังไม่มีแรง โดยสุกรจะมีอัตราการตายร้อยละ ๑๐๐ เมื่อแสดงอาการ

À

และขอความร่วมมือประชาชนแจ้งสุกร มีอาการตายเฉียบพลันมีไข้สูง นอนสุมกัน ผิวน้ำแดง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำโดยเฉพาะใบหู ท้อง ขาหลัง มีอาการทางระบบอื่น เช่น ทางเดินหายใจ เช่นไอ ทางเดินอาหาร ถ่ายเป็นเลือด แท้ง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีโทร ๐๓๒-๔๒๕๔๙๖ หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ ๐๖๓-๒๕๕-๖๘๘๘ โดยทันที

เขียนโดย nayanawut

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2019 เวลา 10:39 น. - แก้ไขล่าสุด วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2019 เวลา 10:43 น.

---

Â



Â